

نکات کاربردی و حیاتی برای پرسنل درمانی در مواجهه با بیماران قطعی و مشکوک به کرونا ویروس

افراد در معرض خطر بالا و متوسط

افرادی که بر بالین بیماران حضور دارند و با ترشحات تنفسی آنها در تماس هستند. مثل لوله گذاری ، برونکوسکوپی ، احیا قلبی ریوی و

این گروه باید تحت نظارت فعال قرار گیرند و تا ۱۴ روز پس از آخرین مواجهه خود با بیمار کرونا، از فعالیت در محیط درمانی خودداری کنند.

در صورت بروز هرگونه علائم مانند تب (تب اندازه گیری شده مساوی یا بیش از ۳۷٫۷ درجه سانتی گراد و یا تب ذهنی) و نشانه های تنفسی به نفع عفونت کرونا ویروس (سرفه، تنگی نفس، گلودرد) باید بلافاصله تماس خود را با دیگران قطع کنند و آزمایشات بیشتری از آنها انجام شود.

افراد در معرض خطر کم

این گروه که مواجهه محدودی با بیماران کرونا دارند و کمتر در معرض آلودگی هستند، لازم است تا ۱۴ روز پس از آخرین مواجهه احتمالی خود با بیمار، تحت نظر باشند و علائم بیماری را مانیتور کنند و حداقل ۲ بار در روز دمای بدن خود را اندازه گیری نمایند. این افراد هر روز قبل از ورود به محل کار، باید نسبت به عدم وجود علائم بیماری در خود اطمینان حاصل کنند و دمای بدن خود را اندازه گیری نمایند. در صورتی که هیچ علائمی به از

نشانه های کرونا ویروس نداشتند نیاز به محدودیت شغلی ۱۴ روزه نخواهند داشت.

افرادی که در معرض خطر نیستند

این گروه که هیچ تماسی با بیماران ندارند، نیاز به پایش علائم بیماری و محدودیت شغلی نخواهند داشت.

نکته مهم: تمام دستورات فوق برای تماس با بیماران مشکوک که هنوز تست آزمایشگاهی مثبت ندارند و یا جواب آزمایش آنها ۴۸ الی ۷۲ ساعت آینده مشخص میشود، لازم است اعمال شود.